


## CONDILOMA LATA, PLACAS MUCOSAS Y ALOPECIA PARCHEADA

**Autores:** Rodolfo David Palacios Diaz<sup>1</sup>, Carlos Abril Pérez<sup>1</sup>, Mónica Pozuelo Ruiz<sup>1</sup>, Begoña Escutia Muñoz<sup>1</sup>, Rafael Botella Estrada<sup>1</sup>

1. Departamento de Dermatología, Hospital Universitari i Politècnic La Fe, Valencia, España.

### Caso clínico:

Un hombre de 27 años fue remitido para evaluación de glosodinia y lesiones orales de dos semanas de evolución. Como antecedente pertinente, el paciente presentó un chancro sifilítico tratado con penicilina G benzatínica (BPG) ocho meses antes de la visita. A la exploración física destacaba la presencia de placas ovaladas eritematosas ligeramente elevadas con leve depilación dispersa en el dorso de lengua (Figura 1A). Además, se evidenció alopecia parcheada con una apariencia apolillada (Figura 1B).



### Juicio diagnóstico:

Sífilis secundaria

### Discusión:

Las pruebas serológicas mostraron una prueba de reagina plasmática rápida (RPR) positiva con un título de 1/32. La evaluación histopatológica de una placa mucosa demostró hiperplasia epitelial y un denso infiltrado linfoplasmocitario en la lámina propia (Figura 1C). La inmunohistoquímica (Figura 1D) y la PCR confirmaron la presencia de *Treponema pallidum*, por lo que se realizó el diagnóstico de sífilis secundaria<sup>1</sup>. El tratamiento con tres dosis de BPG resultó en una evolución clínica y serológica favorable<sup>2</sup>.

El espectro clínico de la sífilis secundaria es amplio y puede simular otras enfermedades. Las manifestaciones en mucosa oral, aunque no son infrecuentes, son diversas y pueden presentarse de forma aislada o asociadas a signos extraorales<sup>3</sup>. Por consiguiente, al enfrentar lesiones orales es importante un alto grado de sospecha, valorar factores de riesgo y considerar esta entidad para prevenir una demora en el tratamiento.

## Referencias

1. Smith MH, Vargo RJ, Bilodeau EA, et al. Oral Manifestations of Syphilis: a Review of the Clinical and Histopathologic Characteristics of a Reemerging Entity with Report of 19 New Cases. *Head Neck Pathol.* 2021;15(3):787-795. doi:10.1007/s12105-020-01283-4
2. Janier M, Unemo M, Dupin N, Tiplica GS, Potočník M, Patel R. 2020 European guideline on the management of syphilis. *J Eur Acad Dermatol Venereol.* 2021;35(3):574-588. doi:10.1111/jdv.16946
3. Lampros A, Seta V, Gerhardt P, Isnard C, Husson C, Dupin N. Oral forms of secondary syphilis: An illustration of the pitfalls set by the great imitator. *J Am Acad Dermatol.* 2021;84(2):348-353. doi:10.1016/j.jaad.2020.04.089